

## امراض التى تصيب الماعز فى مصر

### أهم الأمراض الشائعة التى تصيب الماعز

#### ١- مرض إنتهاب الضرع:

يعتبر واحداً من أخطر مشاكل مزارع إنتاج اللبن، وأكثرها تكلفة وإزعاجاً حتى أنه أصبح السبب الثالث من أسباب استبعاد الحيوانات بعد انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للحيوان، وللوقاية منه لابد من التأكد من خلو العنزات من مرض إنتهاب الضرع بالكشف الدوري عليها، ويجب نظافة وتطهير أرضية الحظائر. واستعمال المطهرات في تطهير ضرع العنزات العشار عقب الحلابه .

أما المعز المصابة فيتم حلابه الربع المصاب من الضرع وحقن المضادات الحيوية داخل الحلمات المصابة .

#### ٢- مرض السل الكاذب:

يسبب المرض نوع من البكتيريا يسمى كورني بكتيريا ,وينتقل المرض عن طريق بلع الميكروب مع المواد الملوثة بواسطة الأغنام والمعز كذلك عند إحداث خدوش أو جروح للجلد، وأعراضه: يظهر علي جسم الحيوان أورام وخراريج خاصة مناطق الغدد الليمفاوية أسفل الفكين وأسفل الأذن وعلي الكتف (أعلي عظمة اللوح (وأعلي الضرع أمام عظام الفخذ، وهذه الأورام والخراريج تكون ذات صديد مميز باللوز الأخضر ، ويتسبب في انخفاض إنتاجية الحيوان علاوة علي تشوه جلده، ويبقى الحيوان حاملاً للمرض حتي لو شفي ظاهرياً منه، وينصح بالتخلص من الحيوانات المصابة بالذبح داخل السلخانة .

### الوقاية :

يجب نظافة وتطهير الحظائر والحيوانات، والحقن بلقاح السل الكاذب . (bcg) 2/1مل / للحملات المولودة حتى عمر شهر ويكرر كل ٦شهور .

### العلاج :

يتم علاج الخراريج جراحياً مع إتباع الطرق الصحية لذلك ويجب دفن المواد الصديدية دفناً عميقاً أو حرقها .

٣- الإجهاض المعدي أو الحمي المالطية أو الإجهاض الوبائي. يسبب المرض بكتريا البروسيللا ميليتنسيس، وتنتقل عن طريق الفم أثناء الأكل أو التلوث عن طريق اللمس والميكروب قادر علي الانتقال إلي الإنسان الذي يتعامل مع الحيوانات المصابة فهو بذلك من الأمراض المشتركة، تتسبب البروسيللا في حدوث الإجهاض للعنزات العشار خاصة في الشهرين الآخرين من الحمل ,وللوقاية منه لابد من التأكد من خلو العنزات منه بالكشف الدوري للحيوانات، والتخلص من الحيوانات المصابة بالذبح داخل السلخانة، مع الاتصال بمديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

#### ٤- مرض الكلوة الرخوة في الجديان:

يسبب المرض نوع من بكتريا كلوستريديم برفرنجيز ويوجد في الأمعاء ولكن تحت ظروف معينة نتيجة اختلاف نوع الغذاء أو تغيير كميات الغذاء المقدم للحيوان .

## أعراضه :

نفوق مفاجئ بنسب كبيرة تصل إلى ٩٠% من الحيوانات المصابة .  
عدم توازن الحيوان المصاب - ظهور تشنجات - إسهال ونفاخ قبل الوفاة - نفوق مفاجئ للجديان  
رغم النمو السريع والحالة الصحية الجيدة - درجة الحرارة طبيعية وقد ترتفع مع ظهور  
التشنجات .

## الوقاية :

تطهير الأحواش وتحصين الحيوانات في المنطقة الموبوءة التي ظهر المرض فيها وبصفة دورية  
بكوفاكسين ٨، وهو تحصين جامع لمجموعة اللاهوائيات ومقاومة الإصابة بالدوسنتاريا وبراعي  
تكراره بعد ٢٤ يوم من التحصين الأول ما لم يكن الحيوان قد تم تحصينه، ثم يكرر كل ٦ شهور  
خاصة في نهاية فترة الحمل قبل الولادة به ٤٥ يوم، والعلاج غير مجدي .

## ومع ذلك فمن الضرورة التنويه إلي النقاط العامة التالية:

الأم التي تحصن دورياً خلال الأشهر الأخيرة للحمل تنقل كمية كبيرة من الأجسام المناعية  
للسرسوب في الأيام الأخيرة قبل الولادة، لحماية المواليد من الأمراض في الفترة الأولى من  
عمرها، ويجب تحصين المواليد بعد فترة شهرين لرفع المستوي المناعي لها .  
الأمهات غير المحصنة تنقل كمية مناعة بسيطة إلي نتاجها لذلك الحملان يجب أن تحصن في  
الأسابيع الأولى من عمرها مثل التحصين لمرض دوسنتاريا الحملان .  
الحيوانات المشتراة ممكن أن تحمل معها أمراض جديدة إلي المزرعة وتشكل خطورة علي  
القطيع الأصلي، ولذلك لابد أن تكون مشتراه من مصدر جيد وموثوق به ومحصنة، وأن يتم  
تجريبها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية بالايغوماك بمعدل ٢/١ مل /كجم حي. - أيضاً من  
الممكن أن تصاب الحيوانات المشتراه في المزرعة ،إذا كان في المزرعة أمراض لم يمرض بها  
الحيوان في حياته السابق، ولذلك لابد من عزلها لمدة شهر علي الأقل بعد وصولها إلي  
المزرعة.

التاريخ : ٢٠١٣/٣/٧م

المصدر :- مركز المعلومات